



Medexpress, 2021-01-15 11:40

Transmisja:

Osoby po transplantacjach powinny być zaszczepione w pierwszej kolejności



Konferencja przed wspólnym posiedzeniem Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci i Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji nt. problemów ze szczepieniami przeciwko COVID-19 u dzieci i osób po przeszczepach narządowych i szpiku.

Prof. senator Alicja Chybicka:

- Osoby po transplantacjach powinny być zaszczepione w pierwszej kolejności.
- Zespół PIMS to coraz poważniejszy problem. Czy powinniśmy dążyć do tego, aby szczepić dzieci off-label? W szczególności niektóre grupy dzieci z określonymi schorzeniami.

Prof. Magdalena Durlik:

- Biorcy przeszczepów należą do grupy wysokiego ryzyka zachorowania na COVID-19 i ciężkiego przebiegu choroby. Śmiertelność w tej grupie przekracza 20%.
- Zakładamy, że nasi pacjenci [osoby po przeszczepach] odpowiedzą na szczepienia przeciw SARS-CoV-2 w stopniu dostatecznym, aby uchronić się przed zachorowaniem lub przed ciężkim przebiegiem choroby.
- Chorzy po transplantacjach, podobnie jak dzieci, nie brali udziału w badaniach klinicznych szczepionej Pfizer i Moderna. Dlatego nie możemy na 100% przewidzieć, jaka będzie u nich skuteczność szczepień.

- Szczepionki mRNA są całkowicie bezpieczne dla pacjentów po przeszczepach.
- Rekomendacje światowych towarzystw naukowych z dziedziny transplantologii zalecają szczepienie chorych po przeszczepach.



WARTO PRZECZYTAĆ

Problemy ze szczepieniami przeciwko COVID-19 u dzieci i osób po przeszczepach narządowych i szpiku