



Medexpress, 2021-04-07 16:00

Konferencja EMA:

# Zakrzepy bardzo rzadkim działaniem niepożądanym szczepionki AstraZeneca

CET15:59:15

NEXT ON EBS+ 16:00 LIVE


EMA press briefing

- Conclusion of the assessment of the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) of COVID-19 Vaccine AstraZeneca and thromboembolic events

LANGUAGES OR

EBS+

- W Europie podano do tej pory 34 mln dawek szczepionki AstraZeneca.
- EMA ma informacje o 169 przypadkach zakrzepicy po przyjęciu tego preparatu.
- Najwięcej przypadków zakrzepicy odnotowano u kobiet poniżej 60. roku życia.
- Zwykle w ciągu 2 tygodni od szczepienia.
- Specyficzne czynniki ryzyka nie są znane.
- Związek przyczynowo-skutkowy jest prawdopodobny.
- Zakrzepy pojawiały się w zatokach żylnych mózgu, żyłach trzewnych oraz w tętnicach.
- Towarzyszyła im trombocytopenia.
- Objawy, które (po zaszczepieniu) powinny skłonić do pilnego szukania pomocy medycznej to: duszności, bóle w klatce piersiowej, obrzęk nóg (szczególnie niesymetryczny), uporczywy ból brzucha, długotrwałe bóle głowy, zaburzenia widzenia, wybroczyny podskórne poza miejscem podania szczepionki.
- Korzyści ze stosowania szczepionki AstraZeneca przewyższają ryzyko.



## WARTO PRZECZYTAĆ

Nowe dane o skuteczności szczepionki Pfizer-BioNTech