



Medexpress, 2019-12-04 10:32

Lek na cukrzyce typu II zanieczyszczony?



Fot. Thinkstock/Getty Images

W Ministerstwie Zdrowia odbywa się posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie doniesień dot. zanieczyszczenia metforminy toksycznym związkiem chemicznym.

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” popularny lek zażywany przez pacjentów z cukrzycą typu II - metformina - może być zanieczyszczony trującym związkiem chemicznym, służącym m.in. do wywoływania nowotworów u szczurów laboratoryjnych.

DGP wskazuje, że zanieczyszczenie rakotwórczym związkiem chemicznym N-nitrozodimetyloaminą (NDMA) - szczególnie niebezpiecznym dla wątroby, stwierdzono w Azji oraz Niemczech.

Dzisiaj eksperci Europejskiej Agencji Leków będą rozmawiali z przedstawicielami wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia odbywa się posiedzenie sztabu kryzysowego.

Wśród leków zawierających metforminę, DGP wymienia:

- Avamina (tabletki powlekane)

- Avamina SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
- Etform (tabletki powlekane)
- Etform 500 (tabletki powlekane)
- Etform 850 (tabletki powlekane)
- Formetic (tabletki powlekane)
- Glucophage 500 (tabletki powlekane)
- Glucophage 850 (tabletki powlekane)
- Glucophage 1000 (tabletki powlekane)
- Glucophage XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
- Metfogamma 500 (tabletki powlekane)
- Metfogamma 850 (tabletki powlekane)
- Metfogamma 1000 (tabletki powlekane)
- Metformax 500 (tabletki)
- Metformax 850 (tabletki)
- Metformax 1000 (tabletki powlekane)
- Metformax SR 500 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
- Metformin Bluefish (tabletki powlekane)
- Metformin Galena (tabletki)
- Metformin Vitabalans (tabletki powlekane)
- Metifor (tabletki)
- Siofor 500 (tabletki powlekane)
- Siofor 850 (tabletki powlekane)
- Siofor 1000 (tabletki powlekane)
- Symformin XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Źródło: www.gazetaprawna.pl