



Medexpress, 2020-03-28 15:12

Czy leki na nadciśnienie, choroby serca i nerek wpływają na pogorszenie stanu zdrowia osoby chorej na COVID-19?



Fot. Getty Images/iStockphoto

Europejska Agencja Leków (EMA) informuje, że obecnie nie ma dowodów z badań klinicznych lub epidemiologicznych, które wykazałyby związek między inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) i blokerami receptora angiotensyny (ARB lub leki sartanowe) a pogorszeniem stanu zdrowia osoby chorej na **COVID-19**. Ekspert w leczeniu zaburzeń serca i ciśnienia krwi, w tym Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, wydali już oświadczenia w tym zakresie.

EMA ściśle monitoruje sytuację i współpracuje z zainteresowanymi stronami w celu koordynacji badań epidemiologicznych nad wpływem inhibitorów ACE i ARB u osób z COVID-19.

Ważne jest, aby pacjenci, którzy mają jakieś pytania lub nie są pewni co do swoich leków, skonsultowali się z lekarzem lub farmaceutą i nie przerywali regularnego leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

WARTO PRZECZYTAĆ



[Jak leczyć nadciśnienie podczas pandemii COVID-19](#)

Leki należy przepisywać i stosować zgodnie z zaleceniami klinicznymi, z należyтым uwzględnieniem wszelkich ostrzeżeń i innych informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) i ulotce dla pacjenta, a także wytycznych wydanych przez WHO oraz odpowiednie organy krajowe i międzynarodowe.

Źródło: URPL

WARTO PRZECZYTAĆ



[Ile pielęgniarek i położnych jest zakażonych koronawirusem?](#)