



Dr Leszek Borkowski, 2021-05-31 09:08

Dr n. farm. Leszek Borkowski:

Obserwacja po szczepieniu COVID-19



Fot. arch. pryw.

15 minut po szczepieniu czekają osoby nie mające zdarzeń alergicznych - **większość populacji**.

30 minut po szczepieniu czekają **osoby , które miały już reakcje alergiczną** po dowolnej szczepionce lub po podaniu dowolnej iniekcji.

Objawy anafilaksji – oznaki układowe wskazujące na potrzebę natychmiastowej reakcji:

- **Układ oddechowy:** uczucie zamknięcia lub ucisku w gardle, piskliwy dźwięk podczas oddychania, chrypka, niewydolność oddechowa np. duszność lub świszczący oddech, kaszel, trudności w połykaniu/ślinienie się, przekrwienie nosa, wyciek z nosa - katar, kichanie.
- **Przewód pokarmowy:** nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha lub skurcze.
- **Układ sercowo-naczyniowy:** zawroty głowy, omdlenia, częstoskurcz - nienormalnie szybkie tętno, niskie ciśnienie krwi, puls trudny do znalezienia lub „słaby”, sinica - niebieskawe przebarwienie, błądź.
- **Skóra/błona śluzowa:** pokrzywka uogólniona, rozległe zaczerwienienie, swędzenie, zapalenie spojówek, obrzęk: oczu, ust, języka, usta, twarz lub kończyny.

- **Układ nerwowy:** pobudzenie, drgawki, ostra zmiana w stan psychiczny, poczucie zbliżającej się zagłady - uczucie, że coś złego ma się wydarzyć.
- **Inne:** nagły wzrost wydzieliny z oczu, nosa lub ust, niemożność utrzymania moczu.

Objawy często pojawiają się w ciągu 15-30 minut po szczepieniu ale mogą także pojawić się po kilku godzinach. Nie wszystkie objawy wymienione powyżej występują łącznie podczas anafilaksji. Nie wszyscy pacjenci mają reakcje skórne - wbrew obiegowej opinii.

Po fachowym rozpoznaniu - domięśniowo adrenalina.