



Dr Leszek Borkowski, 2021-12-15 09:48

Szczepienia dzieci od 5 do 11 lat - telegraficzny opis



Fot. arch. pryw.

Kolor plastikowego wieczka fiolki: Pomarańczowe od 5 do 11 roku życia. Fioletowe od 12 do 100 lat życia i więcej.

Jeśli fiolka ma szare plastikowe wieczko, należy zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego Comirnaty 30 mikrogramów/dawkę dyspersja do wstrzykiwań.

Szczepienia 5-11 lat startują fizycznie od 16 grudnia 2021.

Wszystkich szczepimy domięśniowo.

Dlaczego szczepimy, bo bez dzieci nie ma przyszłości.

a/ aby dziecko nie chorowało na COVID-19

b/ aby dziecko nie chorowało na PIMS

c/ aby jedno dziecko nie zarażało drugie w rodzinie

c/ aby można było normalnie uczyć się i cieszyć się życiem wyjazdami, urlopami.

Czym się różnią

1/ - **ilością tej samej substancji czynnej** czyli mRNA ze zmodyfikowanymi nukleozydami. **Tozinameran** jest jednoniciowym, informacyjnym RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5', wytwarzanym z wykorzystaniem bezkomórkowej transkrypcji in vitro na matrycy DNA, kodującym białko szczytowe. Pomarańczowe wieczko / 5-11 lat / 10 mikrogramów koncentratu / tozinameranu / do sporządzenia dyspersji. Fioletowe wieczko 12 -100 lat 30 mikrogramów koncentratu / tozinameranu /.

2/ - **substancjami pomocniczymi**, w pomarańczowych wieczka / 5-11 lat / nie ma soli potasu i sodu a jest trometamol wolny i w postaci chlorowodoru. To pozwala na przechowywanie **pomarańczowego wieczka / 5-11 lat / 2,5 miesiąca po rozmrożeniu** w temp. 2-8 stop C lub **12 godzin w temp. 8-30 stop C**. a **fioletowe wieczko /12-100 lat/ 1 miesiąc w temp 2-8 stop C** lub do max **2 godziny w temp. do 30 stop C**.

3/ **kolorem wieczka pomarańczowe dla 5-11, fioletowe od 12 do 100 i więcej.**

Jak szczepimy

Pomarańczowe wieczko - dzieci 5-11 lat, dwie dawki przerwa 21 dni

Fioletowe wieczko - dzieci 12-18 lat, dwie dawki przerwa 21 dni

Fioletowe wieczko - dorośli 18-100 lat, trzy dawki / dwie normalne odstęp 21 dni, trzecia dawka booster 6 miesięcy /.

Fioletowe wieczko - pacjenci z ciężkimi zaburzeniami odporności booster 28 dni po drugiej dawce.

Działania niepożądane

Ryzyko częstotliwości wystąpienia działań niepożądanych największe w grupie 5-11 lat najmniejsze w grupie zdrowych dorosłych.

Dorośli chorzy na różne choroby współistniejące leczeni różnymi lekami mogą różnie reagować.

Bardzo częste działania niepożądane: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób **w miejscu wstrzyknięcia: ból, obrzęk, zaczerwienienie, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni, dreszcze, ból stawów, biegunka, gorączka**. Niektóre działania niepożądane występowały nieco częściej u młodzieży w wieku od 12 do 15 lat niż u dorosłych.

Częste działania niepożądane: mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób: **nudności, wymioty**.

Dr nauk farm. Leszek Borkowski